

Σύμπλεγμα χολαγγειοηπατίτιδας, χρόνιας
παγκρεατίτιδας, ιδιοπαθούς
φλεγμονώδους νόσου του εντέρου –
“Τριαδίτιδα” - της γάτας

Τ. Ράλλης* και Κ. Αδαμαμά-Μωραΐτου**

* Καθηγητής, **Επίκ. Καθηγήτρια
Κλινική των Ζώων Συντροφιάς (Μονάδα Παθολογίας),
Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ



Φρου-Φρού

11 ετών, Περσική, ♀ (στειρωμένη)

Ληθαργικότητα, μείωση όρεξης, απώλεια σωματικού βάρους
Ψηλάφηση κοιλιάς

ALP ↑, ALT ↑, γ-GT ↑, λιπάση ↑, BUN, κρεατινίνη,
γλυκόζη, ιονισμένο Ca, K, Na, P, OX ↑, AX ↑, EX

F Intestinal

Διαιτητικά μέτρα

Κινολόνες

Επιδείνωση ίκτερου, πόνος στην κοιλιά

Διαφορική διάγνωση

- ΧΠ
- ΣΧΗ
- ΙΦΝΕ
- Υπερθυρεοειδισμός
- Νεόπλασμα
- Νεφρική νόσος
- ΗΛ
- Καρδιοπάθεια

Τριαδίτιδα

- Σύνδρομο που αφορά μεσήλικες ή μεγάλης ηλικίας γάτες ανεξάρτητα φυλής ή φύλου, με συνύπαρξη χρόνιας παγκρεατίτιδας (ΧΠ), σύμπλεγμα χολαγγειοηπατίτιδας (ΣΧΗ) και ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (ΙΦΝΕ)

Σχετικά καινούργιο σύνδρομο

Περιορισμένα επιδημιολογικά
στοιχεία

78 γάτες

Πανεπιστήμιο
Μινεσότα

15 γάτες

Κλινική Παθολογίας Ζώων
Συντροφιάς, Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ

1 ΧΠ

10 ΧΠ, ΣΧΗ, ΙΦΝΕ

1 ΣΧΗ

3 ΣΧΗ, ΧΠ

Από που ξεκινάει η τριαδίτιδα;



- Μεγάλη συχνότητα
 - Έμετοι
- Κοινή εκβολή χοληφόρου και παγκρεατικού πόρου
- Αυξημένη χλωρίδα στο πρόσθιο τμήμα του εντέρου (*E. coli*, *Bacteroides*, πρωτόζωα, *T. gondii*)

Κλινική εικόνα

- Ληθαργικότητα
- Μείωση όρεξης
- Έμετος
- Διάρροια
- Ίκτερος
- Ταχύπνοια
- Υποθερμία
- Πόνος πρόσθια
- Πυρετός
- Πάχυνση εντερικών ελίκων
- Διόγκωση ήπατος
- Διόγκωση παγκρέατος

Αιματολογική εικόνα

- PCV: ελαφρά μείωση
- WBC: ελαφρά αύξηση (ΣΧΗ, ΙΦΝΕ)
 - Αιμοπετάλια: ελαφρά μείωση

Βιοχημική εικόνα

- Λιπάση ↑
- γ-GT, ALP, ALT, AST ↑↑
- OX, AX ↑

Λευκωματίνες
BUN, κρεατινίνη
Ηλεκτρολύτες

Σπάνια διαταράσσονται

- Λιπάση ασκίτικού υγρού ↑
 - fTLI ↑, fPLI ↑↑
 - FeLV – FIV: αρνητικά
- Ανάλυση ούρου: λιπουρία, χολοχρωστικές, κρύσταλλοι χολερυθρίνης

Λαπαροτομή - βιοψία

- Το συντομότερο δυνατό

Προσοχή: χορήγηση πριν Vit K X 1-2 ημέρες

Λήψη χολής – εντερικού περιεχομένου για καλλιέργεια (*E. coli*, *Enterococcus*, *Bacteroides*)

Προσοχή εάν έχει χορηγηθεί αντιβιοτικό

θεραπεία

Συμπτωματική

- Οροί
 - Διογκωτικά πλάσματος
 - Vit K
- (εάν PT, PTT ↑)

Διαιτητικά μέτρα

```
graph LR; A[Διαιτητικά μέτρα] --> B[Διά της βίας, διαζεπάμη]; A --> C[Με καθετήρα (ρινοοισοφαγικό, γαστροστομίας)];
```

**Διά της βίας,
διαζεπάμη**

**Με καθετήρα
(ρινοοισοφαγικό, γαστροστομίας)**

- **Feline Hepatic (Royal Canin, Eukanuba)**
 - **I/d (Hill's)**

Αντιβιοτικά (μετά το αντιβιογράμμα) ή

- Αμοξυκιλλίνη (20 mg/kg/8ωρο) + κεφαλεξίνη (20 mg/kg/12ωρο) PO

ή

- Χλωραμφενικόλη σε μορφή βάσης (50 mg/ζώο/12ωρο) PO

ή

- Μετρονιδαζόλη (10-20 mg/kg/12ωρο) PO

ή

- Κινολόνες

Πρεδνιζολόνη
2-4 mg/kg/24ωρο PO

Ουρσοδεοξυχολικό οξύ
10-15 mg/kg/24ωρο

SAME
(S-adenosylmethionine) PO

Βιταμίνη Κ
(1,5-5 mg/24ωρο)

PIVKA πρωτεΐνες για ανταπόκριση στη θεραπεία

Σε περίπτωση αποτυχίας

- Κυκλοσπορίνη
- Μεθοτρεξάτη
- Χλωραμβουκίλη

Δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα

Πολλές παρενέργειες

Πρόγνωση

Επιφυλακτική – Καλή

Με μακροχρόνια προσπάθεια